REVISTA VIRTUAL
SOCIEDAD PARAGUAYA DE MEDICINA INTERNA

Artículo: Causas de brote lúpico en pacientes que requieren hospitalización en el Hospital Nacional, Paraguay, del 2020-2025

https://doi.org/10.18004/rvspmi/2312-3893/2026.e13122625

DICTAMEN DEL EVALUADOR 1

1. Resumen breve de los principales hallazgos de este artículo

El artículo describe las causas de brote lúpico que requieren hospitalización donde el 20,7% de los pacientes ingresaron por anemia hemolítica, seguida de los síndromes nefrítico y urémico. El 56,1% cursaba su debut de lupus eritematoso sistémico y 25,6% consumían su medicación habitual de forma regular, sin embargo, de igual manera, cursaban con un brote lúpico.

2. Fortalezas y aportes de este artículo

Relevancia clínica y epidemiológica: el enfoque en causas de hospitalización por brote de LES es pertinente, especialmente considerando la carga de morbimortalidad asociada a la enfermedad.
Consistencia con la literatura regional: los hallazgos sobre predominio femenino, edad media y compromiso renal concuerdan con estudios previos en Latinoamérica, lo que refuerza la validez externa en contextos similares.

3. Debilidades y limitaciones de este artículo

✓ Diseño metodológico
- El diseño retrospectivo, descriptivo y transversal limita la capacidad de establecer asociaciones causales o identificar factores predictivos.
- El uso de muestreo no probabilístico introduce potencial sesgo de selección, lo cual no se discute con suficiente profundidad.

✓ Análisis estadístico limitado
- El análisis es exclusivamente descriptivo. No se realizaron comparaciones entre subgrupos (ej. debut vs recaída) ni análisis multivariado
- Esto reduce significativamente el impacto científico del estudio.

✓ Interpretación de resultados
- La afirmación de que las causas renales son las más frecuentes se basa en la suma de categorías, lo cual puede inducir a sesgo interpretativo.
- No se explora adecuadamente el hallazgo de que los pacientes adherentes al tratamiento también presentaron brotes, lo cual es clínicamente relevante.

✓ Sesgos potenciales
- El carácter monocéntrico y el hecho de ser un hospital de referencia en hematología podrían explicar la alta frecuencia de anemia hemolítica.
- Este sesgo se menciona, pero no se analiza en profundidad ni se ajusta metodológicamente

Se sugiere: argumentar en la discusión y explicar por qué incluyendo al menos con 25 citas bibliográficas pertinentes. Además, se sugiere dar las recomendaciones de lo que se debe mejorar de esta temática en Latinoamérica Finalmente, explicar de dónde se obtiene ese término *brote lúpico*.

Evaluador: Dr. José Manuel Vela Ruiz
Institución: Universidad Ricardo Palma. Lima, Perú
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1811-4682

REVISTA VIRTUAL
SOCIEDAD PARAGUAYA DE MEDICINA INTERNA

DICTAMEN DEL EVALUADOR 2

1. Resumen breve de los principales hallazgos de este artículo

Este artículo original estudia, retrospectivamente, las causas de brote lúpico que llevaron a hospitalización en 83 pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES). Predominaron mujeres (75,6%) de 34 ± 14 años, con debut de enfermedad en 56,1% de casos. Las principales causas fueron anemia hemolítica (20,7%), síndromes nefrótico (14,6%) y urémico (11%), con actividad severa por SLEDAI en 63,4%. El ANA fue positivo en 100%, y la mortalidad fue baja (2,4%), mayormente por infecciones

2. Fortalezas y aportes de este artículo

- Relevancia local: datos de hospital paraguayo que complementan literatura regional sobre LES.
- Estructura clara: incluye resumen, introducción, métodos, resultados con tablas, discusión y referencias.
- Ética adecuada: aprobación por comité y respeto a bioética declarados.
- Tablas útiles: detallan procedencia, tipos de brote y características clínicas/laboratoriales de forma descriptiva.
- Discusión contextual: compara con estudios paraguayos, argentinos y globales sin sobre interpretarlos

3. Debilidades y limitaciones de este artículo

No se reportan todos los porcentajes de brotes (suman <100% en tabla 2): verificar y completar tabla para consistencia numérica.

Evaluador: Dr. Alejandro Jesús Bernardino Valenzuela Fernández.
Institución: Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, Filial Santa Rosa del Aguaray. Santa Rosa del Aguaray, Paraguay**.**
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-0887-5047