

## ■ REPORTE DE CASO

### Artritis gotosa crónica

### Chronic gouty arthritis

José Martín Sánchez Insfrán<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Médicas. Postgrado en Medicina Interna. San Lorenzo, Paraguay

#### RESUMEN

Se presenta caso de varón con poliartritis crónica por depósito de uratos.

**Palabras claves:** gota, artropatías por depósito de cristales, ácido úrico

#### ABSTRACT

We presents a case of a man with chronic polyarthritis due to urate deposition.

**Keywords:** gout, crystal arthropathies, uric acid

#### CASO CLÍNICO

Varón de 55 años hipertenso, diabético, con historia de artritis gotosa de larga data en tratamiento irregular con colchicina además de antiinflamatorios no esteroideos, acude al servicio de urgencia por un cuadro de 3 meses de artralgiás de ambas rodillas, codos y articulaciones metacarpofalángicas. No ha presentado fiebre ni otra sintomatología en la anamnesis por aparatos. Al examen físico (Figura 1) dichas articulaciones se encontraban tumefactas, eritematosas, dolorosas, con aumento local de temperatura. Tenía además nódulos de consistencia sólida pétreas, distribuidos en los miembros, siendo los de mayor tamaño los ubicados a nivel del codo. La analítica laboratorial reveló leucocitosis con neutrofilia, PCR elevada y ácido úrico 11,1 mg/dL. Se catalogó el cuadro como crisis gotosa <sup>(1,2)</sup>. Fue tratado con prednisona (30 mg/día) además de colchicina 1,5 mg día en dosis divididas.

---

**Artículo recibido:** 17 diciembre 2021 **Artículo aceptado:** 4 enero 2022

**Autor correspondiente:**

Dr. José Martín Sánchez Insfrán

Correo electrónico: [sanchez.martin093@gmail.com](mailto:sanchez.martin093@gmail.com)

 Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una Licencia Creative Commons CC-BY 4.0



**Figura 1.** Tofos ubicados a nivel de 2°, 3°, 4° y 5° articulaciones metacarpofalángicas en mano derecha (A), 2, 3° y 5° articulaciones metacarpofalángicas izquierdas, con salida espontánea de secreción blanquecina tipo yeso de 3° articulación metacarpofalángica (A-B). Tofos distribuidos en forma bilateral en codos (C-D) y rodillas (E-F).

### REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Weaver JS, Vina ER, Munk PL, Klauser AS, Elifritz JM, Taljanovic MS. Gouty Arthropathy: Review of Clinical Manifestations and Treatment, with Emphasis on Imaging. *J Clin Med.* 2021 Dec 29;11(1):166. doi: 10.3390/jcm11010166.
2. Parathithasan N, Lee WK, Pianta M, Oon S, Perera W. Gouty arthropathy: Review of clinico-pathologic and imaging features. *J Med Imaging Radiat Oncol.* 2016 Feb;60(1):9-20. doi: 10.1111/1754-9485.12356.